

隨息居重訂霍亂論

隨息居重訂霍亂論第四藥方篇

加昌王士雄夢隱纂

鎮海陳 亨春泉校

藥性

原蠶砂 諸霍亂之主藥也。

黃芩 溫病轉霍亂之主藥。凡吐下而熱邪痞結上焦。胸次不舒者。並可與黃連半夏同用。

石膏 暑熱霍亂之主藥。凡吐利而苔黃大渴者。並宜用之。外挾風寒者。佐以紫蘇桂枝香薷生薑之類。內挾痰滯者。佐以厚朴半夏菖蒲橘紅之類。下兼寒溼者。佐以防已細辛海桐皮威

靈仙之類

滑石 淫熱霍亂之主藥。熱甚者佐石膏。淫甚者佐茵陳。

薏苡仁 霍亂轉筋溺祕者之主藥也。

木瓜 霍亂轉筋溺不祕者之主藥也。

香薷 夏令浴水迎風而霍亂之主藥也。

扁豆 中虛而暑淫霍亂之主藥也。

西洋人參 虛人霍亂之主藥也。

枳椇蘆朮子 停食霍亂之主藥也。

梔豉石菖蒲 穢濁霍亂之主藥也。

棟實黃檗桑葉絲瓜 霍亂而肝火盛者之主藥也。

茅根地丁益母蒲公英 霍亂而血分熱熾之主藥也。

竹茹石斛蘆根梔子枇杷葉 霍亂嘔噦之主藥也。

厚朴蘆根大腹皮 霍亂脹滿之主藥也。

茵陳連翹綠豆皮絲瓜絡 霍亂身黃之主藥也。

通草車前海金沙 霍亂無溺之主藥也。

綠豆銀花竹葉黃連 霍亂誤服熱藥之主藥也。

旋覆紫苑麥蘗蘆根子 霍亂誤補之主藥也。

人參龍骨牡蠣甘草石脂餘糧 霍亂大虛欲脫之主藥也。

桂枝 傷寒轉霍亂之主藥也。

紫蘇霍香生薑厚朴白豆蔻 霍亂因外寒之主藥也。

吳茱萸烏藥砂仁高良薑 霍亂因內寒之主藥也。

人參白朮炙甘草蓮子 中虛而寒溼霍亂之主藥也。

丁香木香川椒神麴 瓜果魚蟬生冷傷中霍亂之主藥也。

乾薑附子肉桂硫黃 陽虛中寒而霍亂及寒霍亂誤服寒藥之主藥也。

方劑 附目次

臥龍丹 二方 以下治熱證須預備者

立效丹

開關散

速效丹

甘露消毒丹

玉樞丹

紫金丹

行軍散

千金丹

即平安散

紫雪

碧雪

絳雪

即紅靈丹

飛龍奪命丹

煉雄丹

三聖丹

以下治寒證須預備者

蟾酥丸

四方

霹靂散

回陽膏

黃芩湯

以下各方治熱證

黃芩加半夏生薑湯

梔子豉湯

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

桂苓甘露飲

六一散

茵陳湯

四苓散

平胃散

正氣散

半夏厚朴湯

六和湯

香薷飲

黃連香薷飲

左金丸

黃芩定亂湯

燃照湯

連朴飲

蠶矢湯

解毒活血湯

驚輕湯

昌陽瀉心湯

麥門冬湯

致和湯

五苓散

以下各方治寒證

理中丸

厚朴生薑半夏甘草人參湯

四逆湯

通脈四逆加豬膽汁湯

附子杭米湯

吳茱萸湯

漿水散

冷香飲子

大順散

神香散

來復丹

桂枝湯

異功散

梅花丸 此下杜絕霍亂方

資生丸 二方

臥龍丹 治諸痧中惡霍亂五絕諸般卒倒急暴之證

西牛黃 飛金箔 各四分 梅花冰片 荊芥 羊躑躅 各二錢

香當門子 五分 硃砂 六分 猪牙皂角 一錢五分 燈心炭 二錢五分 九味共研

細瓷餅密收毋使泄氣以少許搐鼻取嚏垂危重證亦可用

涼開水調灌分許併治癰疽發背蛇蝎蜈蚣咬傷用酒塗患處。按羊躑躅俗名鬧羊花辛溫大毒不入湯劑入酒飲能殺人。近目卽昏翳今肆中臥龍丹以此爲君藥。又去牛黃而加蟾酥減輕燈心炭而冰麝不過略用些須耳。故藥力大遜甚不可恃。好善者必自配製也。

又

西黃_{六分} 梅片 當門子_{各一錢} 北細辛_{一錢} 牙皂 羊躑躅_{各二錢}
燈心炭_{一兩} 七味製如上法主治亦同。

立效丹 治同上

砂仁_{三兩} 明雄黃 蓬砂_{各一兩} 梅冰 當門子_{各九錢} 火硝_{六錢}

萆薢

牛黃

各三錢

八味共研細瓷餅緊收勿令泄氣每用分

許蘆管吹入鼻內若卒倒氣閉重證則七竅及臍中均可放
置立蘇凡暑月入城市抹少許于鼻孔可杜穢惡諸氣

開闢散

治番痧臭毒痛如絞氣閉神昏欲絕之證

燈心炭

兩一

羊躑躅

三錢

北細辛

杜蟾酥

牙皂

各二錢

牛黃

梅片

當門子

各一錢

八味共研細瓷餅緊裝毋令泄氣每少

許吹鼻得嚏即生

速效丹

治諸痧手足麻木牙關緊急目閉不語胸背有紅點

或咽腫心痛及風餐露宿寒暑雜感危急之證

北細辛

牙皂

各三錢五分

硃砂

二錢五分

廣木香

陳皮

桔梗

貫衆

薄荷葉

防風

製半夏

甘草

各一錢

枯礬

五分

白

芷

錢十三味共研細末。查餅紫裝。每用三分吹入鼻孔。寒溼

內盛而病重者。開水調服一錢。方內蘇合香二錢尤妙。按痧

藥方。藥品珍貴者多。惟此價廉。用以搐鼻。頗亦有效。故人徐

君亞枝嘗合大料。交余在淳溪施送累年。鄉人無不感頌。

甘露消毒丹

天土

治暑溼霍亂時感痧邪及觸冒穢惡不正之

氣。身熱倦怠。脹悶。肢痠。頭眩。咽疼。身黃。口渴。痞痢。淋濁。泄瀉。

瘡瘍。水土不服。諸病。但看病人舌苔淡白。或厚膩。或乾黃者。

疫邪。尚在氣分。悉以此丹主之。凡醫臨證。亦當準此化裁。自

可十全為上。

飛滑石

十五兩

絲苗陳

十一兩

淡黃芩

十兩

石菖蒲

六兩

川貝母

木

通

各五兩

霍香

連翹

射干

薄荷葉

白豆蔻

各四兩

十一

味不可加減。生曬研細末。瓷餅密收。每服三錢。開水溫溫服。

日二。或以神麴糊丸彈子大。調化服亦可。此丹治溼溫時疫。

著效亦神。累年同人合送。價廉功敏。無出此方之右者。一名

普濟解疫丹。

太乙玉樞丹

一名解毒萬病丹

治諸痧霍亂疫癘障氣喉風五絕尸疰

鬼胎驚忤顛狂百般惡證及諸中毒諸癰疽水土不服黃疸

鼓脹蛇犬蟲傷內服外敷功難殫述洵神方也

山慈姑

去皮洗淨焙

川文蛤

即五倍子槌破洗刮內淨

千金子

即續隨子去油取淨霜各二兩

紅芽大戟一兩當歸子錢三五味先將慈蛤戟三味研極細末
再入霜香研勻粳米湯調和乾溼得宜于辰日淨室中木臼
內杵千餘下每料分四十錠故亦名紫金錠再入飛淨硃砂
飛淨明雄黃各五錢尤良或以加味者杵成薄片切而用之
名紫金片每服一錢涼開水調下孕婦忌之又不可與甘草
藥同進也

太乙紫金丹 治霍亂痧脹嵐障中惡水土不服喉風中毒蛇
犬蟲傷五絕暴厥顛狂癰疽鬼疔魘魅及暑溼溫疫之邪瀾
漫熏蒸神明昏亂危急諸證

山慈姑

川文蛤

各二兩

紅芽大戟

白檀香

安息香

蘇

合油各一兩五錢

千金霜一兩

明雄黃

飛琥珀各五錢

梅冰

當門子

各三十一味各研極細再合研勻濃稷米飲料丸綠豆大外

以飛金爲衣每錢許涼開水下按一瓢云此方北蘇合丸而

無熱較至寶丹而不涼兼玉樞丹之解毒備二方之開閉洵

爲濟生之仙品立入百功之上藥也又按昔人所云太乙丹

能治多病者卽上二方也今俗傳太乙丹不知創自何人藥

品龐雜羣集燥熱惟風餐露宿黎藿人寒溼爲病者服之頗

宜若一概施之誤人匪淺

行軍散 治霍亂痧脹山嵐瘴癘及暑熱穢惡諸邪直干包絡

頭目皆暈不省人事危急等證並治口瘡喉痛點目去風熱

障翳摘鼻辟時疫之氣

西牛黃

當門子

真珠

梅冰

蓬砂

各一錢

明雄黃

飛淨入錢

火硝

分三飛金二十頁

八味各研極細如粉

再合研勻

瓷餅密收

以蠟封之每三五分涼開水調下

千金丹

一名人馬平安散

治同上

明雄黃

蓬砂

硝石

各一兩

硃砂

五錢

梅冰

當門子

各二錢

飛

金

一百頁

七味各為細末合研勻

瓷餅緊裝

每二三分涼開水

下或嗅少許于鼻內或加牛黃泔溪云此祕方也

紫雪

治痧脹穢毒心腹疔痛霍亂火熾躁脅煩狂及暑火溫

熱障疫毒厲諸邪直犯臚中猝死溫瘧發斑狂易叫走五尸

五疰鬼魅驚癇急黃蠱毒麻痘火閉口舌生瘡一切毒火邪

火穿經入臟蘊伏深沉無醫可治之證

黃金

百兩石頑云須賃金鋪中煉過葉子煮之方有性味而止用十兩薛公望云不用亦可洄溪云如用飛金萬兩

研入

寒水石

石頑云如無真者以元精石代之

慈石 醋石膏

白滑石

各三斤石

尤妙

頑止用

四石共搗碎用水一斛

石頑一斗

連金煮至四斗

石頑五升去

滓入下藥

犀角屑 羚羊角屑 青木香

切沉香

研各五斤石頑止用五錢按斤字恐是兩字之誤

丁香

一兩石頑止用二兩

元參

切

升麻

各一斤石頑六錢甘草八兩

石頑用生者入

入味入前藥汁中煮取一斗五升

石頑一升五合

去

錢洄溪用藥

滓入下藥

朴硝十斤石頑用焰硝四斤石頑用三兩洄溪云二味入煎藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升石頑七合半投在木盆中半日欲凝入下藥。

硃砂

研細水飛淨三兩石頑五錢

當門子

研一兩二錢五分

二味入煎藥

中攪勻勿見火寒之二日候凝結成霜紫色鉛罐密收每服三四分至一錢量用新水調灌按雞峰方無慈石滑石硝石二角祇用各十兩丁沉香各五兩升麻六兩朴硝二斤麝香卻用三兩餘六味分兩同醫通云此方即千金元霜加甘草丁香硃砂三味遂易紫雪之名余以其香味易散故減小其制竊謂宜從張氏配合為是。

碧雪 治熱極火閉痧脹昏狂及霍亂誤服熱藥煩躁瞽亂及
時疫憤亂便秘發斑一切積熱咽喉腫痛口糜齦爛舌瘡喉
閉水漿不下等證

寒水石 石膏 硝石 朴硝 芒硝 牙硝 青黛 甘
草 八味等分。先將甘草煎湯去滓。納諸藥再煎。以柳木篦
不住手攪。令消鎔得所。卻入青黛和勻。傾入砂盆內。候凝結
成霜。研細密收。每錢許涼開水下。上焦病以少許含化。嚥津
不能嚥物者。蘆筒吹入喉中。齒舌病抹患處。

絳雪

一名八寶
紅靈丹

治霍亂痧脹肢厥脈伏轉筋昏暈障癘時疫暑
毒下痢等證。並治喉痺牙舌諸病。湯火金刃諸傷。均搽患處。

硃砂

牙硝

各一兩

明雄黃

飛

蓬砂

各六錢

礞石

煨四錢

梅片

當

門子

各三錢

飛真金

五十八兩

味擇吉日

淨室中

各研極細

再研

勻瓷餅

緊收鎔蠟

封口

毋使泄氣

每

一分

涼開水

送下

小兒

減半

以藥佩帶

身上

可辟疫氣

牛馬羊痘

以此點其眼

即愈

飛龍奪命丹

治痧脹

疔痛霍亂轉筋厥冷脈伏神昏危急之

證及受溫暑

障疫穢惡陰晦

諸邪而眩暈

痞脹

腎亂昏狂或

卒倒身強

遺溺不語

身熱癰瘰

宛如中風

或時證

逆傳神迷

狂謔

小兒驚癇

角弓反張牙關緊閉諸證

硃砂

飛二兩

明雄黃

飛

燈心炭

各一兩

人中白

漂八錢

明礬

青黛

飛各

梅冰

去節各四錢

麻黃

真珠

牙皂

當門子

蓬砂

各三錢

五錢

飛各

梅冰

去節各

四錢

真珠

牙皂

當門子

蓬砂

各三錢

五錢

飛各

梅冰

去節各

四錢

真珠

牙皂

當門子

蓬砂

各三錢

五錢

飛各

飛各

梅冰

去節各

四錢

真珠

牙皂

當門子

蓬砂

各三錢

五錢

飛各

梅冰

去節各

四錢

錢西牛黃錢二杜鰾酥火硝各一錢五分飛真金三百十六味各
研極細合研勻。資餅緊收。毋令泄氣。以少許吹鼻取嚏。重者
再用涼開水調服一分。小兒減半。按此丹芳香辟穢。化毒祛
邪。宣氣通營。全體大用。真有斬關奪隘之功。而具起死回生
之力也。

煉雄丹 治暑穢痧邪直犯包絡。神明閉塞。昏憤如尸。及霍亂
初定。餘熱失清。驟爾神昏如醉。如寐。身不厥冷。脈至模糊者。
皆燥熱無形之氣。蒙蔽臚中。如人在煙塵障霧中行。治失其
宜。漸漸燥悶而死。此非牛黃清心犀角地黃等方可療。此丹
主之。

極明雄黃

分一

研極細

提淨牙硝

分六

研細同入銅勺內。微火

鎔化撥勻。俟如水時。急瀉清者于碗內。粗渣不用。俟其凝定。

收藏。此丹龍家祕制也。按此法見游宦紀聞。陳平伯載此方。黃多而硝少。素園糾其誤。謂黃多硝少。何能鎔化。今依楊定雄一硝六為率。

木通

錢一

通草

錢三

陳雨水

按冬雪水似更良

一碗煎出味。

去滓。再以陳

雨水九碗與藥汁和勻。每次用藥水一碗。磨入犀角三分。挑入煉雄三釐調勻。徐徐冷灌。能于三日內服盡十碗藥水。必有清痰吐出數碗而愈。筆齋嘗親驗矣。

三聖丹

治寒溼為病諸痧腹痛霍亂吐瀉

木香一兩不見火明雄黃二兩明礬三兩共研細末以鮮荷葉橘葉霍

香葉各二兩搗汁丸綠豆大每服九分重者再服。

蟾酥丸 治暑月貪涼飲冷食物不慎兼吸穢惡成痧脹腹痛

或霍亂吐瀉

杜蟾酥化火酒硃砂飛各五錢明雄黃飛茅山蒼朮土炒焦各一兩丁香

牙皂各三錢當門子一錢七味各研極細蟾酥打丸鳳仙子大辰

砂為衣放舌底化下重者二三丸洄溪云此祕方也。

又 治同上

杜蟾酥燒酒化開明雄黃水飛各三錢丁香 木香 沉香各二錢茅山

蒼朮土炒焦四錢硃砂飛一錢五分當門子一錢西牛黃三分九味各研極

細擇上吉日淨室中合研勻同蟾酥加糯米糗尖五箇搗干
餘下丸如椒子大曬乾盛于瓷碗內再用硃砂一錢五分燒
酒調塗碗內蓋好用力搖一二千下則光亮矣密收瓷瓶內
每三粒輕者一粒重者五粒泉水下

姚氏蟾酥丸 治同上

杜蟾酥大酒浸詳如無杜明雄黃研硃砂飛各二兩木香麝丁香
麝茅朮滑石飛各四錢當門子一兩八味各研極細和入蟾酥杵
勻丸黍米大每藥丸就四兩以火酒噴溼蓋在碗內加入飛
淨硃砂六錢竭力搖播以光亮爲度

又一名通靈 萬應丹 治同上而力較峻

杜蟾酥

九錢燒酒化

錦紋大黃

六兩曬乾

硃砂

飛

明雄黃

飛

明天麻

乾焙

麻黃

去節焙各三兩六錢

甘草

去皮微炒二兩四錢

丁香

六錢

當門子

三錢

茅朮

米泔水浸

切焙三兩

十味各為細末以梗米粥漿和杵丸蘆服子大硃砂為

衣每七丸納舌下少頃陰陽水下若研細吹鼻亦可取嚏

霹靂散

治陽虛中寒腹痛吐瀉轉筋肢冷汗淋苔白不渴脈

微欲絕者

附子

濃甘草湯煎去毒

吳茱萸

池去第一次汁鹽水微炒各三兩

絲瓜絡

燒酒洗五兩

陳

伏龍肝

二兩燒酒一小杯收乾

木瓜

絡石藤七錢煎汁炒乾一兩五錢

丁香

蒸曬一兩

六味

共為極細末分作十九服外以醋半酒

鹽

一錢五分

藕肉

一兩

煎

滾耳上炙存性研每服加三釐每病止須用半匙參湯下按

確係寒證。此散固佳。若未辨陰陽。而用熱藥。以爲外治。尙無大害。內服之藥。極宜審慎。勿輕試也。

回陽膏 治同上

生香附

或用吳茱萸亦可一兩八錢

母丁香

一兩二錢

上桂心

八錢

倭硫黃

五錢

門子

四錢

五味共研極細

瓷餅密收

每二三分安臍中。以膏藥

封之一時

卽愈。

孕婦忌貼。

按霍亂轉筋。既有寒暑之分。亦有

寒暑雜感而成者。更有暑伏于內。而寒束于外者。故服藥最

宜審慎。況利多亡陰。津液大奪。雖可投熱藥者。亦恐剛烈劫

陰。終于不救。此方藥雖猛峻。而僅取其氣。由臍入腹。自能溫

通臟腑。以逐寒邪。不致傷陰。誠爲善策。惟口渴苔黃。下利極

熱者。顯爲陽證。雖見肢冷脈伏。亦勿妄貼此膏。更張其焰也。以上諸方。雖分別熱證寒證之治。而和平猛厲。用得宜。並皆佳妙。然非倉卒可辦者。故列諸前茅。冀仁人君子量力製備。刊明藥味。證治。廣爲傳播。俾醫家病家一覽瞭然。不但將死者可以得生。而不死者亦不致誤藥以喪其生。利濟之功。不其偉哉。方下兼及別證治例者。既不敢沒良方之大用。且以推廣施藥之仁懷也。

黃芩湯

傷寒論

治溫病變霍亂之主方。用者因證加減。

黃芩

三兩

炙草

各二兩

芍藥

十二枚

水一斗。煮取三升。去渣。溫服一升。日再夜一服。

黃芩加半夏生薑湯

傷寒論

原方加半夏半升生薑三兩按冬傷于寒至春發為溫病有或利或嘔之兼證皆少陽犯陽明也故仲聖以黃芩清解溫邪協芍藥泄迫血之熱而以甘棗夏薑奠安中土法至當矣其溫病轉為霍亂果由中虛飲聚而伏邪乘之者仍宜以此法治之如火勢披猖上衝下迫或脈數口渴或熱深厥深則無藉乎奠中滌飲當從事于瀉火清中舉一反三在人善悟也

梔子豉湯

傷寒論

治溫熱暑疫轉為霍亂之主劑

梔子

十四枚

香豉

四合

絲裹

水四升先煮梔子得二升半內豉煮取升半去滓分二服按此傷寒吐劑也。然古方梔子生用故能涌吐。今皆炒黑用之。雖不作吐。洵溪謂其滌熱除煩之性故在也。而余之治熱霍亂獨推以爲主劑。蓋梔子苦寒善泄鬱熱。故肘後方以之治乾霍亂矣。豉經蒸腐性極和中。凡霍亂多由溼鬱化熱挾穢濁惡氣而擾攘于中宮。惟此二物最爲對證良藥。奈昔人皆不知察也。且二物之奇。匪可言罄。如偶以銀花竹葉清暑風配以白蔻菖蒲宣穢惡。溼甚者臣以滑朴。熱勝者佐以芩連。同木瓜扁豆則和中。合甘草鼠粘而化毒。其有誤投熱藥而致煩亂躁悶者。亦可藉以爲解救厥功懋矣。而古今之治

霍亂者從不引用。豈非一大闕典耶。

白虎湯

傷寒論

治暑熱熾盛而爲霍亂者

石膏

一斤

知母

六兩

甘草

炙二兩 粳米六合

水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服按治霍亂

米須用陳倉者或用生苡仁亦妙

白虎加人參湯

傷寒論

治證如前而元氣已虛者

原方加人參三兩

按白虎湯神于解熱。妙用無窮。加人參則補氣以生津。加桂枝則和營而化瘧。加蒼朮則清溼以治痿。變而爲竹葉石膏湯。則爲熱病後之補劑。余因推廣其義。凡暑熱霍亂之兼表

邪者加香薷蘇葉之類。轉筋之熱極似寒。非反佐莫能深入者。少加細辛威靈仙之類。痰溼阻滯者。加厚朴半夏之類。血虛內熱者。加生地地丁之類。中虛氣弱者。加白朮苡仁之類。病衰而氣短精乏者。加大棗枸杞之類。無不奏效如神也。

竹葉石膏湯

傷寒論

治中虛暑熱霍亂及霍亂已定而餘熱未

清虛羸少氣者

竹葉二握石膏一斤

半夏半升

洗

人參三兩

麥門冬一升

粳米半升

甘草二兩

炙二兩

水一斗先煮六味取六升去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三按集驗云此方加生薑治嘔最良余謂治

霍亂宜用地漿煎更妙

桂苓甘露飲

河間

治暑熱狹溼之霍亂

桂皮

去白朮

猪苓

各五錢

茯苓

去澤瀉

各一

寒水石

石膏

甘草

炙各二兩

一方

滑石

四兩

九味

為末

每三錢

溫水

或新汲

水

或生薑湯

量證調下

小兒

每服

一錢

按此方

一名桂苓白

朮散

一方

不用猪苓

或云去猪苓

加入參

名桂苓白朮散

尤散

一方

不用猪苓

或云去猪苓

加入參

名桂苓白

朮散

一方

不用猪苓

或云去猪苓

加入參

名桂苓白朮散

六一散

即益元散一名天水散

河間

桂府

膩白滑石

六兩

甘草

炙一兩

二味

為末

每三錢

溫水

或新汲

水

調下

日三

挾表邪者

以茵白

五寸豆豉

五十粒

煎湯

調下

本方

加黃丹

名紅玉散

加青黛

名碧玉散

加薄荷

名雞蘇散

本方

加黃丹

名紅玉散

加青黛

名碧玉散

加薄荷

名雞蘇散

本方

加黃丹

名紅玉散

加硃砂。名辰砂益元散。

茵陳湯

肘後

治霍亂發斑

茵白一握香豉三合

水煎入童子小便一合日三服

按石頑云本方藥味雖輕。功效最著。凡虛人風熱。伏氣發溫。及產後感冒。靡不隨手獲效。余謂胎前外感。何嘗不是妙劑。蘆根竹葉蘇葉黃芩可以隨證佐入。

四苓散

溫疫論

治溼盛霍亂胸悶潮瀝而渴者

茯苓 猪苓 澤瀉 橘皮

水煎服

按吳氏五苓去桂而治胃中溼熱。最爲有見。且以橘皮易朮。則無實中之弊。而有利氣之功。當變而變。斯爲善用古法。欲平霍亂者。宜知所趨嚮矣。

平胃散 局方 治溼盛于中霍亂吐瀉

茅朮

去粗皮米泔浸五兩

紫厚朴

去皮薑汁炒

陳皮

去白各三兩二錢

甘草

炙二兩

味爲末。每服二錢。水一盞。薑一片煎七分服。轉筋者加木瓜。本方加藿香半夏名金不換正氣散。

藿香正氣散 治溼蘊于中寒襲其外而爲霍亂吐瀉者

厚朴

陳皮

桔梗

白朮

半夏

各二兩

大腹皮

一本作蒼朮或用槿

可 白芷

茯苓

蘇葉

藿香

各三兩

甘草

炙一兩

十一味爲

粗末。每三錢。薑三片。棗一枚。煎服。

蘭臺秘範此方無白朮似更妥謝城

按右二方皆治風寒外感。食滯內停。或兼溼邪。或吸穢氣。或傷生冷。或不服水土等證。的是良方。若溫暑熱證。不兼寒溼者。在所切禁。今人謂其統治四時感證。不審病情。一概濫用。殊可笑也。用治霍亂。薑棗宜裁。

半夏厚朴湯

一名四七湯 金匱

治情志不舒。痰溼阻氣。而成霍亂者。

半夏

升一

厚朴

三

茯苓

四

乾蘇葉

二

生薑

五

水七升。煮取四升。分溫四服。

按此方既主七情不適之鬱痰證。亦治寒溼不化。風感外侵。食滯不消。誤投滋補。因而病劇者。無不所嚮輒捷。

六和湯 治夏月虛人外感風寒內傷生冷之霍亂吐瀉而身發熱者

香薷錢二人參 茯苓 甘草炙 扁豆 厚朴製 木瓜 杏仁

去皮半夏錢各一 藿香 砂仁炒研各六分 生薑片三 大棗一枚

水煎服

香薷飲 局方 治暑月乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡

寒煩躁口渴腹滿之霍亂

香薷一斤 厚朴炒薑汁 白扁豆各半斤 三味為粗末每五錢至一兩

水煎冷服

黃連香薷飲 活人 治同上

原方加薑汁炒黃連四兩

左金丸 治霍亂轉筋肝火內熾或吐青綠苦水者

川連六兩 吳茱萸取陳而開口者一兩 二味同煮乾為細末米飲餵丸綠

豆大每三錢陳木瓜五錢煎湯下吐酸味者竹筍生苡仁各

三錢煎湯下按張雨農司馬見余采此方極為首肯云嘗在

都城見杜石樵少宰亦用此藥治愈多人也

黃芩定亂湯夢隱 治溫病轉為霍亂腹不痛而肢冷脈伏或肢

不冷而口渴苔黃小水不行神情煩躁

黃芩酒炒 焦梔子 香豉炒各一錢五分 原蠶砂三錢 製半夏 橘紅鹽水

炒各一錢 蒲公英四錢 鮮竹筍二錢 川連薑汁炒六分 陳吳萸泡淡一分

陰陽水二錢煎一錢候溫徐服轉筋者加生苡仁八錢絲
瓜絡三錢潮行者用木瓜三錢澤盛者加連翹茵陳各三
錢。

燃照湯

霍亂論

治暑穢挾溼霍亂吐下脘痞煩渴苔色白膩外

顯惡寒肢冷者

飛滑石

四錢

香豉

炒三錢

焦梔

二錢

黃芩

酒炒省頭草各一錢

製厚朴

製半夏

各一錢

水煎去滓研入白蔻仁八分溫服苔膩而厚濁者去白蔻。

加草果仁一錢煎服。

連朴飲

霍亂論

治溼熱蘊伏而成霍亂兼能行食滌痰。

製厚朴錢二 川連薑汁炒 石菖蒲 製半夏錢各一 香豉炒 焦梔各三

錢 廬根二兩

水煎溫服

霍亂霍亂論 治霍亂轉筋。肢冷腹痛。口渴煩躁。目陷脈伏。時

行急證。

晚蠶砂錢五 生苡仁 大豆黃卷錢各四 陳木瓜錢三 川連薑汁炒二錢

製半夏 黃芩酒炒 通草錢各一 焦梔錢一 陳吳萸泡淡三分

地漿或陰陽水煎稍涼徐服

解毒活血湯夢隱 治溫暑痧邪。深入營分。轉筋吐下。肢厥汗多。

脈伏溺無。口渴腹痛。面黑目陷。勢極可危之證。

連翹 絲瓜絡 淡紫菜 各三錢 石菖蒲 一錢 川連 吳萸水炒二錢

砂 地丁 益母草 各五錢 生苡仁 八錢 銀花 四錢

地漿或陰陽水煮生綠豆四兩取清湯煎藥和入生藕汁

或白茅根汁或童便一杯稍涼徐徐服

駕輕湯 霍亂論 治霍亂後餘邪未清身熱口渴及餘熱內蘊身

冷脈沉湯藥不下而發呃者

鮮竹葉 生扁豆 各四錢 香豉 炒 石斛 各三錢 枇杷葉 剉二錢 橘紅

鹽水 陳木瓜 各一錢 焦梔 五分

水煎溫服

昌陽瀉心湯 夢思 治霍亂後胸前痞塞湯水凝下或渴或呃

石菖蒲

黃芩

酒製半夏

各一錢

川連

薑汁炒五六分

蘇葉

三四分

製厚

朴入鮮竹茹

枇杷葉

各二錢

薑根

兩

天雨水急火煎徐徐溫服

小溲祕澀者加紫苑

此方甚巧謝城

按此瀉心湯證也。何必另立方治。以暑熱穢濁之邪與傷寒不同。故五瀉心皆有圍枳方鑿之格。漫為引用。豈徒無益已哉。茲以菖蒲為君。辛香不燥。一名昌陽者。謂能靖滌濁邪而昌發清陽之氣也。合諸藥以為劑。共奏蠲痰泄熱。展氣通津之績。已歷試不爽矣。

麥門冬湯

金匱

治霍亂後餘熱未清神倦不饑無苔而渴或火

升氣逆乾咳無痰

麥冬一兩製半夏一錢五分人參一錢甘草六分杭米半合大棗四枚

水煎溫分四服

按海藏以竹葉易半夏治溫熱後房勞復之氣欲絕者大效。余謂卽不因房勞復而氣液兩虧不能受重劑峻補皆可以此湯接續其一綫之生機。余屢用輒效。

致和湯霍亂論治霍亂後津液不復喉乾舌燥渴短便澹

北沙參 生扁豆 不斛 陳倉米各四錢枇杷葉剉鮮竹葉

麥冬各三錢陳木瓜六分生甘草一錢

水煎服

五苓散傷寒論治傷寒轉霍亂身熱頭疼渴欲飲水

朮石頑云宜用生白朮茯苓猪苓各十八銖按二十四銖爲一兩每銖重四分二釐弱六銖爲鎰卽二錢五分十八銖澤瀉一兩桂五錢五味爲末以白飲和服方寸卽七錢五分

七日三多飲煖水汗出愈

按仲聖于霍亂分列熱多寒多之治。皆爲傷寒轉爲霍亂而設。故二多字最宜玩味。所云熱多者。謂表熱多于裏寒也。寒多者。裏寒多于表熱也。豈可以熱多二字遂謂此方可治熱霍亂哉。沈果之云。其用桂者。宜陽氣通津液于周身。非用之以通水道下出也。用瀉朮二苓以通三焦之閉塞。非開膀胱之溺竅也。如果熱入而渴。復用桂朮以溫液耗津。又加苓澤以滲之。是熱之又熱。耗之又耗。速之斃矣。余謂觀此。則多飲

暖水汗出愈之義益明。故霍亂無陽氣鬱遏身熱之表證。無三焦閉塞氣化不宣之裏證。而欲飲水者。切勿誤解熱多爲熱證。而妄援聖訓浪投此藥也。石頑又可皆語焉未詳。河間則加三石以駕馭之。茲復詳述方義。庶用者知所取舍焉。而今人治霍亂病。不察其有無外挾風寒內傷生冷之兼證。輒以胃苓湯爲通用之方。因而僨事者亦多。且古方用散。不過三錢。權量又小。今世改爲湯劑。動輒一二兩。權量又大。宜乎中病者恆少而誤人者恆多也。豈獨霍亂然哉。可慨也夫。又按此方與苓桂朮甘湯同爲溫中滌飲之劑。而力較峻。凡霍亂之寒溼內盛。水飲阻閉三焦者。雖外無風寒之表邪。未

嘗不可用也。故亦治水蓄之癰。溼聚之腫。氣滯者加厚朴。氣虛者加人參。名春澤湯用藥如用兵。苟能量敵而選將。斯戰無不克矣。

理中丸

傷寒論

治寒霍亂口不渴者

人參 甘草 白朮 乾薑各三兩 四味搗篩爲末。蜜和丸雞

黃大以沸湯數合和一丸。碎研溫服之。日三夜二。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯湯法。以味依兩數切。用水八升煮取三升。去滓溫服一升。日三

加減法。若臍上築者。腎氣動也。去朮加桂四兩。尤氏云。臍上築者。臍上築然跳動。腎氣上而之脾也。脾方受氣。朮之甘

能壅脾氣。故去之。桂之辛。能下腎氣。故加之。按此陽虛之腎氣動。欲作奔豚也。故去朮加桂。以杜其上凌之萌。若陰虛而臍上築。築者。大忌剛燥之劑。非峻滋肝腎之陰。不可。蓋一爲水動。一爲火動也。

吐多者。去朮加生薑三兩。尤氏云。吐多者。氣方上壅。甘能壅氣。故去朮。辛能散氣。故加生薑。按鄒潤安云。旣吐且利。有屬太陰者。有屬少陰者。在少陰。則無用朮之理。在太陰。亦在可用。可不用之列。以朮能治脾胃虛。不能治脾胃實。故吐多者。去之。下多者。還用之。蓋朮能舉脾之陷。不能定胃之逆也。又洄溪云。寒霍亂可用理中者。百不得一。余謂是寒霍亂矣。可

用理中矣。尙有如此細密加減之法。何今人既不議病。又不議藥。輕于一試。何異以不教之民而使之戰耶。吁。可哀已。下多者。還用朮。悸者。加茯苓二兩。尤氏云。下多者。脾氣不守。故須朮以固之。悸者。腎水上逆。故加茯苓以導之。按今人治霍亂。既不辨其證之虛實寒熱。亦不察其吐多下多。溫補率投。漫無忌憚者。吾不知其何心也。渴欲得水者。加朮。足前成四兩半。尤氏云。渴欲得水者。津液不足。白朮之甘。足以生之。按此渴因脾虛不能爲胃行其津液。故加朮以補脾而致其津液也。所謂白朮能生津液者。其義如此。豈熱燥津液而渴者所堪一試哉。

腹中痛者加人參。足前成四兩半。尤氏云。腹中痛者。裏虛不足。人參之甘。足以補之。按裏虛腹痛。必喜溫。按寒者加乾薑。足前成四兩半。尤氏云。寒者。腹中氣寒也。乾薑之辛。足以溫之。按五苓主熱多。謂表有熱也。理中主寒多。謂裏有寒也。故方下既有腹中未熱。益至三四丸之法。此復云寒者加乾薑。是腹中尚未熱。故獨于此味又加重也。蓋腹中寒。爲寒之眞諦。故仲聖不嫌煩複。而瑣瑣教人。以此爲辨證之法。顧昧者一見吐下。肢寒。略不察其腹中光景。何如擅以薑附丁桂。欲其轉熱。遂至從此而一身皆冷。嗚呼。豈未聞熱深厥深之聖訓乎。

腹滿者去朮加附子一枚。服湯後如食頃飲熱粥一升許。微
自溫。勿發揭衣被。尤氏云。腹滿者氣滯不行也。氣得甘則
壅得辛則行。故去朮加附子。按飲熱粥一升許。固是助藥力。
亦是辨證法。設時行熱霍亂。不但熱粥在所大忌。即使不忌。
亦萬不能強飲升許。果能飲熱粥升許者。豈非虛寒爲病乎。
故可以理中治之。若蔽于古而不知今。是房琯之以車戰也。
按原方加附子名附子理中湯。加青皮陳皮名治中湯。加枳
實茯苓名枳實理中湯。加黃連名連理湯。合五苓名理苓湯。

厚朴生薑半夏甘草人參湯傷寒論 治虛人寒溼霍亂

厚朴

去皮炙

生薑

切各半斤

半夏

洗半升

甘草

炙二兩

人參

一兩

水一斗煮取三升去滓溫服一升日三

四逆湯

傷寒論

治陰寒霍亂汗出而四肢拘急小便復利脈微

欲絕而無頭痛口渴者

生附子

一枚乾薑

兩半甘草

兩炙二

水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可用大附子

一枚乾薑三兩

按附子乾薑非攻蕩之品何以強人乃可如倍用蓋無論補瀉寒熱諸藥皆賴身中元氣載之以行敢氣強者堪任重劑若氣弱者投劑稍重則氣行愈餒焉能駕馭藥力以為補瀉寒熱之用耶凡事皆然用藥特其一端耳顧知之者鮮所以

覆敗多而成功少也。

通脈四逆加豬膽汁湯

傷寒論

治陰寒霍亂愈後四肢拘急脈

微欲絕者。

前方加入豬膽汁半合和服如無豬膽以羊膽代之

附子杭米湯

金匱

治中寒霍亂肢冷腹痛吐少嘔多者

附子

薑汁炮切

半夏

薑汁炒

甘草

炙各三錢

大棗

十枚

杭米

半升

水五升煮米熟湯成去滓溫服一升

吳茱萸湯

傷寒論

治少陰吐利厥逆煩躁及厥陰寒犯陽明食

穀欲嘔。

吳茱萸

一斤洗

人參

三兩

生薑

六兩切

大棗

十二枚擘

水七升煮取二升去滓分三服

漿水散

潔古

治陰寒霍亂暴瀉如水汗多身冷氣少腹痛脈沉

或脫者。

甘草

乾薑

附子

桂

各五錢

良薑

半夏

俱醋炒各二錢

漿水煎去滓冷服

按石頑云漿水乃秫米和麴釀成如醋而淡今人點牛乳作餅用之或用澄綠豆粉之漿水尤佳余謂地漿亦可用

冷香飲子

治陰寒霍亂腹痛脈沉細或絃緊無汗惡寒面如

塵土四肢厥逆陽氣大虛之證。

甘草

附子

草果仁

橘紅

各一錢

生薑

五片

水煎冷服

大順散 局方 治襲涼飲冷陰寒抑遏。陽氣而成霍亂。水穀不分。

脈沉而緊者。

甘草

四兩

乾薑

杏仁

去皮尖

桂心

各六錢

先將甘草同白砂

炒至八分黃熟。

王晉三云白砂即河砂

次入乾薑同炒。令薑裂。次入杏

仁同炒。候不作聲爲度。篩去砂。與桂心同搗爲散。每二錢水

煎服。或沸湯調服。如煩躁。井華水調下。

按洄溪云。此治暑月內傷飲冷證。非治暑也。又甘草多于諸

藥八倍。亦非法。此等病。百不得一。而世人竟以之治燥火之

暑。病殺人無算。可勝悼哉。余謂以上三方。皆治夏令因畏熱

而浴冷臥風。冰瓜過啖。反爲陰溼所傷致病。實夏月之傷寒也。故用藥如是。如名醫類案所載羅謙甫治商參政與完顏小將軍二案。俱用熱藥。俱不名曰暑病。又吳球治暑月遠行人案。直曰中寒。蓋深恐後世誤以熱藥治暑。故特舉病因以稱之。可謂名正言順矣。乃昧者猶誤謂此等方爲治暑之藥。誠有一盲引眾盲。相將入火坑之歎。夫盛夏之有寒病。猶隆冬之有熱病。雖不多見。而臨證者不可不諦辨而施治也。

神香散

景岳

治霍亂因于寒溼凝滯氣逆者

丁香

白豆蔻

各七粒

二味研末

湯下小腹痛者加砂仁

七粒

按晉三云此方治寒溼痧脹有神功。與益元散治溼熱痧脹

可謂鍼鋒相對。

來復丹 局方 治上盛下虛。裏寒外熱。伏暑夾陰霍亂危證。

太陰元精石

船上硫黃

硝石

各一兩用硫黃為末。橘紅微火炒結成砂子大。

青皮

去白五靈脂

澄去砂炒令烟盡各二錢

六味為末。醋糊丸。豌豆大。每

服三十丸。白湯下。

桂枝湯

傷寒論

治寒霍亂後身痛不休。

桂枝

去皮芍藥

生薑

切各三兩甘草炙二兩

大棗

十二枚擘

水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。服一升。須臾啜稀熱

粥一升。餘以助藥力。

異功散

治霍亂後中虛主劑。

人參 錢至三錢 白朮 炒黃一錢 茯苓 錢半 甘草 炙六分 橘紅 錢一

水煎服肝風動而身痛肢浮者加木瓜薑棗

梅花丸 治體虛多鬱血熱氣愆木土相乘嘔瀉腹痛易感痧穢霍亂者久服可杜外患兼除宿恙亦主肝胃久痛消瘕調經帶催生種子孕婦忌之

綠萼白梅蕊

飛滑石 七兩以粉丹皮八兩煎

四製香附 三兩

甘松

蓬莪朮

各五錢

山藥

茯苓

各三錢

人參

路參洋參高麗參皆可因

人酌

嫩黃耆

益智仁

砂仁

勿見火各三錢

遠志肉

甘草水製木

香

不見火一

桔梗

錢五分

甘草

分十五味各研細末合研勻煉白

蜜搗丸。每丸重一錢。白蠟置之。每一丸去底。開水調服。
按此方調和氣血。舒鬱培元。男女皆堪久任。以杜諸疴。不僅
可已肝胃之疼。而禦腸胃之亂也。孕婦體堅。或胎氣多滯者。
正宜用以宣展充暢。惟虛而不固者忌之。

資生丸 調和脾胃。運化飲食。滋養營衛。消除百疾。可杜霍亂
等患。

人參酌用白朮各三兩橘紅 查肉 神麴各二兩茯苓一兩甘

草炙五錢川連薑汁炒白蔻仁各三錢九味研細末。煉白蜜搗丸。

彈子大。每食後細嚼一丸。開水下。嚴寒時或用淡薑湯下。
按石頑云。此古方也。與後人加味者雖繁簡不同。而功效不

異

繆氏資生丸 治同上

人參人乳浸飯上蒸烘乾白朮米泔水浸山黃上非蒸九次曬查肉蒸

橘紅略蒸各二兩白茯苓細末水澄蒸曬乾懷山藥切片白扁豆

炒湘蓮肉炒芡實粉炒薏苡仁炒各一兩五錢麥芽炒研磨取霍香

葉不見火枳殼去皮炙桔梗米泔浸去蘆澤瀉切片白薏仁勿見火各

三錢川連如法炒七十七味如法修事細末煉白蜜搗丸每

丸重二錢飯後白湯或橘皮湯砂仁湯嚥化下。

按治法彙醫通蘭臺軌範載此方。皆有神麴二兩其餘分兩

亦稍有參差。名醫方論有神麴無澤瀉。廣筆記云。妊娠三月。

陽明脈養胎。陽明脈衰。胎無所養。故易墮也。宜服此丸。洄溪云。此方治懷孕氣阻。用兼消補之法。以止嘔吐而固胎氣。意頗可取。余謂保胎止吐。皆健運脾胃之功。故曰資生。夫脾胃位鎮中樞。而司出納。爲人生後天之本。一失健運。百病叢生。凡衰老稚弱。及饑飽不時。勞逸過度。思慮久傷之輩。脾胃尤易受病。若能常服此丸。俾升降不愆。周流無滯。揮霍撩亂。于是弭焉。

俱收並蓄待用無遺爲將爲醫理無二致對證發藥諺謂
堪師十劑七方陣圖有法故必藥性明而兵法諳始可制
方臨敵也先藥性後方劑特其大略耳神明變化存乎其
人方先外治而後內服昭慎重也始臥龍而中結以致中
末殿以資生其有如臥龍之才者出而撥亂反正以致中
和則天地位萬物育化日舒長更何疫癘之有哉謹拭目
待之以慰余重訂此書之意焉故列藥方第四

七液丹醫治各症

專治瘟疫瘧痢爛喉丹痧癰疹時毒癰疽一切瘡毒暑風卒忤諸般痧氣等症服法列左

一治痢疾紅者用黑山梔一錢白者用生薑三片煎湯化服

一治瘡疾用生薑三大片製半夏一錢煎湯化服

一治爛喉痧一切雜症白滾湯服

一治大熱不退發癰發痧不得透達輕者一二服重者二三服卽愈

一治喉嚨痛因風火者一服卽愈重者二服若雙單蛾亦多見效惟爛喉痧來勢最速朝發夕死醫藥無效得此有起死回

生之功倘有咽喉腫痛閉塞痰稠卽與五錢送下自然平安
一治夏秋間發熱不止或頭痛頭暈或寒熱交作無論因寒因
暑因食服此一二錢無不卽愈

一治瘟疫流行傷寒時毒服此卽愈

一治諸般痧氣重者此丹雖投猶恐緩不濟急當以卧龍丹吹
鼻取嚏卽與八寶紅靈丹一分吞下如無卽紫金錠塘棲痧
藥皆可所謂急則治其標也

一治目疾或紅或腫或痛羞明眼眵膠結一服卽愈

一治外症用薑汁調敷火丹勝紅腫發痛葱汁調敷

附列原方

上滑石 十二斤

鮮佩蘭葉汁

鮮白蘿蔔汁

鮮藿香葉汁

鮮紫蘇葉汁

鮮薄荷葉汁

鮮側柏葉汁

各三十兩

生

鮮紋大黃

三十兩

晒乾研細末用好陳酒

二斤

拌入

右方將滑石研極細去脚稱准斤兩用粉甘草

三十兩

泡湯

浸漂飛淨以甘草湯盡爲度攤曬瓦盆七液不分先後隨時

傾入惟栢葉難於取汁須浸生藕汁中一同漚爛方絞得汁

出待諸藥俱已拌入曬乾研細收貯最好秤準每服四錢做

成一大丸晒乾封固易於攜帶

此丹每服酌以四錢不論男婦老幼胎前產後及素有血症之人皆可服惟壯實之體及症重者服五六錢不妨小兒減

半

此方余師陳竹坪先生得瑯琊善士所贈始而因見藥料皆非貴品甚鄙之後遇疑似之症他藥罔效試以此丹輒有奇驗實爲至靈至妙先生年製數萬服寄往各省分送活人無算己丑初夏先生謝世余承師志奈力薄難以廣行是以將方刊單求

普天下之樂善君子照方製丹廣爲施送造福無量拜禱

金陵救吞生烟處徐郁聞韶氏謹識

板存上海城內
吉樂齋刻書店